

-2016

TD 1

Exercice 1 – Échauffement : probas discrètes, continues

Q 1.1 Répondez en quelques lignes aux questions suivantes (en français, pas de manière formelle).

Q 1.1.1 Quelle est la relation entre les notions d'événement, événement élémentaire et univers ?

Q 1.1.2 De quoi a-t-on besoin pour construire un espace probabilisé sur un ensemble E dénombrable (pensez à ce que représente un élément de E) ?

Q 1.1.3 Qu'est ce qu'une variable aléatoire et à quoi cela sert ?

Q 1.2 On considère que pour une journée, il pleut avec une probabilité p et qu'il ne pleut pas avec une probabilité $(1 - p)$ de manière indépendante des autres jours. Comment s'appelle la loi qui permet de modéliser la variable aléatoire indiquant le nombre de jours consécutifs ou il pleut avant un jour sans pluie ? Quel est son espérance et sa variance ?

Q 1.3 Dans un jeu de 52 cartes, on prend une carte au hasard : les événements «tirer un roi» et «tirer un pique» sont-ils indépendants ? incompatibles ? quelle est la probabilité de «tirer un roi ou un pique» ?

Exercice 2 – Probabilités continues

Vous pourrez prendre comme exemple dans la suite pour illustration le niveau d'embouteillage pour la variable aléatoire x et la météo comme variable aléatoire discrète y .

Q 2.1 Définir la notion de densité de probabilité et ses propriétés élémentaires. Qu'appelle-t-on densité jointe ? densité marginale ?

Q 2.2 Soit X une variable aléatoire réelle de l'espace probabilité $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$, que vaut $\mathbb{E}(x)$ (en l'exprimant par une intégrale sur Ω et une sur \mathbb{R}) ?

Q 2.3 Exprimer $\mathbb{E}(X|Y = y)$.

Q 2.4 On observe pendant un certain nombre d'années les embouteillages et la météo, on dispose de ses données sous la forme d'un ensemble $E = \{(x_i, y_i)\}$, i indiquant le numéro de l'observation et y_i la météo lors de cette observation. Quel rapport entre $\mathbb{E}(X)$ et $\frac{1}{|E|} \sum_i x_i$? où se retrouve le $p(x)$ dans cette somme ? Exprimez de manière analogue $\mathbb{E}(X|Y = y)$

Exercice 3 – Classifieur Bayésien (auteur : F. Rossi)

Q 3.1

On considère la base de données des votes effectués par les membres de la Chambre des représentants des EUA en 1984 sur 16 propositions importantes. Chaque individu est un membre de la Chambre décrit par 17 variables nominales. La variable Parti prend les modalités Démocrate et Républicain. Les autres variables, V1 à V16 représentent les votes et prennent les valeurs OUI, NON et NSP (pour une absence de vote). Il y a 267 représentants démocrates et 168 représentants républicains.

	NON	NSP	OUI		V1	102	9	156	
	V1	134	3	31	V2	119	28	120	
	V2	73	20	75	V3	29	7	231	
	V3	142	4	22	V4	245	8	14	
	V4	2	3	163	V5	200	12	55	
	V5	8	3	157	V6	135	9	123	
	V6	17	2	149	V7	59	8	200	
Républicains	V7	123	6	39	V8	45	4	218	
	V8	133	11	24	Démocrates	V9	60	19	188
	V9	146	3	19	V10	139	4	124	
	V10	73	3	92	V11	126	12	129	
	V11	138	9	21	V12	213	18	36	
	V12	20	13	135	V13	179	15	73	
	V13	22	10	136	V14	167	10	90	
	V14	3	7	158	V15	91	16	160	
	V15	142	12	14	V16	12	82	173	
	V16	50	22	96					

Q 3.1.1 Combien de valeurs différentes sont possibles pour le vecteur des votes ?

Q 3.1.2 Soit $V=(OUI, NON, NSP, OUI, NON, OUI, OUI, OUI, NON, NON, OUI, NON, NON, NON, NON, OUI)$ le vecteur de vote d'un représentant. Comment estimer s'il est républicain ou démocrate ?

Q 3.2 On considère deux populations, les hommes H de taille moyenne 1,74m avec un écart type de 0,07m et les femmes F de taille moyenne 1,62m avec un écart type de 0,065m (chiffres INSEE 2001). La population H contient h individus et la population F, f individus. On suppose que les répartitions des tailles sont gaussiennes au sein de chaque sous-population.

On choisit aléatoirement uniformément un individu dans la population totale et on veut déterminer en fonction de sa taille uniquement de quelle sous-population il est issu : il s'agit donc de classer les individus en fonction d'une variable continue.

Q 3.2.1 On note G la variable aléatoire indiquant le genre d'une personne choisie au hasard. Donner la loi de G. On note T la variable aléatoire donnant la taille d'une personne choisie au hasard. Donner la densité de T. Calculer $P(G=f|T=t)$.

Q 3.2.2 Donner le classifieur bayésien optimal.

Q 3.2.3 On suppose que $h=f$. Préciser les décisions prises par le classifieur optimal. Comment interpréter cette stratégie de décision ?

Q 3.3 De combien de paramètres est constitué un classifieur bayésien ?

Exercice 4 – Entropie

Q 4.1 On lance un dé truqué n fois, la probabilité de chaque chiffre étant $p(k)$, $k = 1..6$. Exprimer la probabilité d'obtenir la suite (x_1, \dots, x_n) en considérant les expériences indépendantes en fonction de n et de p , puis en fonction de $H(p) = -\sum_k p(k)\log(p(k))$. H est l'entropie de la distribution p . Que remarquez vous pour des valeurs fortes/faibles de H ?

Q 4.2 Quelle est la formulation de l'entropie à votre avis pour une distribution continue ?

Q 4.3 Rappeler la définition d'une fonction convexe. Montrer dans le cas fini l'inégalité de Jensen : $f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X))$

Q 4.4 On appelle entropie conditionnelle $H(Y|X) = \sum_x p(X=x)H(p(Y|X=x))$. Montrer que $H(X, Y) = H(Y) + H(Y|X)$. Qu'en déduire pour l'information mutuelle, $I(Y; X) = H(Y) - H(Y|X)$? Quel intérêt dans le cas de la classification, en supposant X la description des données et Y la classe ?